

RATION QUOTIDIENNE CONSEILLÉE

Poids adulte	Activité normale	Activité intense
	< 1 h d'exercice	> 2 h d'exercice
5 kg	105 g	125 g
10 kg	175 g	210 g
15 kg	240 g	285 g
20 kg	295 g	420 g
25 kg	350 g	420 g
30 kg	400 g	480 g
35 kg	450 g	540 g
40 kg	500 g	595 g
50 kg	590 g	705 g
60 kg	675 g	810 g
70 kg	755 g	910 g
80 kg	835 g	1005 g

Les quantités proposées dans le tableau ci-contre sont des rations moyennes journalières recommandées. Elles servent de base à l'élaboration de la ration quotidienne, mais doivent être adaptées aux besoins réels du chien.

Elles peuvent donc varier en fonction des dispositions individuelles et naturelles de votre animal, ainsi que de ses spécificités génétiques et morphologiques.

A noter :

En période de grand froid, l'absorption d'eau glacée peut entraîner des désagréments digestifs significatifs.

Conservation :

Pour préserver pleinement toute la fraîcheur et l'appétence de cet aliment, il est conseillé de refermer soigneusement le sac après chaque utilisation. Le stocker dans un lieu sec, frais et ventilé, afin de le conserver à l'abri de la lumière, de l'humidité et du soleil.

À utiliser de préférence avant la date de durabilité minimale imprimée avec le numéro de lot sur l'emballage.

En cas de changement d'alimentation : Ne modifiez jamais brutalement le régime alimentaire de votre chien. Son organisme peut avoir besoin d'un peu de temps pour s'habituer à une nouvelle croquette. Pour éviter d'éventuelles perturbations digestives, respectez une transition de 8 à 10 jours environ, en mélangeant progressivement ce nouvel aliment à l'ancien produit, jusqu'à substitution complète.

- Jours 1, 2 et 3 : $\frac{3}{4}$ de l'aliment habituel + $\frac{1}{4}$ du nouvel aliment
- Jours 4, 5 et 6 : $\frac{1}{2}$ de l'aliment habituel + $\frac{1}{2}$ du nouvel aliment
- Jours 7, 8 et 9 : $\frac{1}{4}$ de l'aliment habituel + $\frac{3}{4}$ du nouvel aliment
- Jour 10 et suivants : uniquement le nouvel aliment

CONSEILS

Certains chiens nerveux ou particulièrement gloutons peuvent ingurgiter trop rapidement leurs repas. Plus spécifiquement dans le cadre de meutes ou de groupes importants d'individus (concurrence alimentaire). Les risques sont : aérophagie, ballonnements, fausse déglutition (blocage de l'aliment dans l'appareil respiratoire) ou des diarrhées passagères dites de « surconsommation ».

Chez les chiens très actifs ou de grandes races, une vitesse d'ingestion trop rapide peut également entraîner une prédisposition dangereuse au risque de dilatation-torsion de l'estomac. Le fractionnement de la ration quotidienne en deux repas distincts (matin et soir par exemple) et la séparation des gamelles placées dans des endroits calmes et isolés, permettent de limiter fortement ces comportements à risque.